

FICKKORT

Dessa tabeller kan du skriva ut och klippa ut om du vill använda dem som fickkort.




Preoperativ bedömning av luftväg

Riskparametrar	Grön	Orange	Röd
Gapförmåga	≥4 cm	3-4 cm	≤ 3 cm
Tidigare strålning eller kirurgi mot huvud och hals	Nej		Ja
BMI	<30	30-39 (ASA II)	≥40 (ASA III)
Thyreomentalt avstånd, TMD	7 cm	6-7 cm	<6 cm
Tidigare svår intubation Ex Cormack-Lehane (CL)- klassificeringen I-IV	I-II	III-IV	III-IV
Upper Lip Bite Test	I	II-III	≥III
OSAS (obstruktivt sömnapné syndrom)	Nej	AHI* 15-30	AHI* > 30

* AHI; apné hypopnea index




Upper Lip Bite Test



Modifierad Cormack-Lehane

I	Full vy av glottis, förekommer i 68-74 %, <1 % sannolikhet för svår intubation
II a	Delvis insyn mot glottis förekommer i 21-24 %, innebär 4,3-13,4 % sannolikhet för svår intubation
II b	Endast bakre delen av glottis kan ses eller endast arytenoidbrosk förekommer i 3-6,5 %, ca 65-67,4 % sannolikhet för svår intubation
III	Endast epiglottis ses, ingen insyn mot glottis förekommer i ca 1,2-1,6 %. Kan innebära 80-87,5 % sannolikhet för svår intubation
IV	Varken glottis eller epiglottis, förväntat mycket svår intubation i samtliga fall



FICKKORT



Trakeotomi-triagering

Riskparametrar	Grön	Orange	Röd
Nackrörlighet	100%	80-100%	<80 %
Tidigare strålning eller kirurgi mot huvud och hals	Nej		Ja
BMI	<30	30-39 (ASA II)	≥40 (ASA III)
Syresättningsproblem	Nej	Nej, med syrgas	Ja
Antikoagulation	Nej	bara ASA	Ja
PK(INR)	≤ 1,4		≥1,4
APT-tid	24-32		>32
Syndrom inom huvud hals	Nej		Ja